



### Anweisung für die Zubereitung

Zur Herstellung der gebrauchsfertigen Suspension zum Einnehmen sind folgende Hinweise aus der in die deutsche Sprache übersetzten, zugehörigen Fachinformation zu beachten:

Vor der Anwendung ist zu kontrollieren, ob die Versiegelung des Verschlusses intakt ist. Zum Lockern des Pulvers die Flasche schütteln. Wasser (laut nachfolgender Anweisung) zugeben, Flasche auf den Kopf drehen und gut schütteln. Oder die Flasche bis knapp unter der Markierung auf dem Flaschenetikett mit Wasser füllen, auf den Kopf drehen und gut schütteln. Anschließend exakt bis zur Markierung mit Wasser auffüllen, auf den Kopf drehen und gut schütteln.

Stärke	Für die Rekonstitution benötigte Wassermenge (ml)	Endgültiges Volumen der rekonstituierten Suspension zum Einnehmen (ml)
250 mg / 62,5 mg / 5 ml	Bis zur Markierung 90	100

Vor jeder Verabreichung die Flasche gut schütteln.

#### Erwachsene und Kinder $\geq$ 40 kg:

Eine Dosis mit 500 mg / 125 mg dreimal täglich entsprechend 10 ml 3 x täglich.

#### Kinder < 40 kg:

Kinder bis zum Alter von 6 Jahren sollten vorzugsweise mit Moxiclav und Moxiclav Forte Suspension behandelt werden.

Im Allgemeinen wird täglich eine Dosis von 20 mg / 5 mg bis 60 mg / 15 mg je Kilogramm Körpergewicht gegeben, die in drei Dosen aufgeteilt wird.

Einzel-Dosis	Dosierung	Tagesdosis
125 mg / 31,25 mg 3 x täglich	2,5 ml 3 x täglich	375 mg / 93,75 mg
250 mg / 62,5 mg 3 x täglich	5 ml 3 x täglich	750 mg / 187,5 mg
375 mg / 93,75 mg 3 x täglich	7,5 ml 3 x täglich	1125 mg / 281,25 mg
500 mg / 125 mg 3 x täglich	10 ml 3 x täglich	1500 mg / 375 mg



## Hinweise zum Gebrauch des Messlöffels für orale Verabreichung

### **Es liegt ein Messlöffel für die orale Verabreichung von Moxiclav Forte bei.**

Der Messlöffel darf nur für Moxiclav Forte benutzt werden. Er ist nicht für die Verabreichung anderer Medikamente vorgesehen, da die Markierungen speziell für Moxiclav Forte gelten.

Die Dosis ist auf den Markierungen des Messlöffels in Millilitern (ml) angegeben. Er ist für 2,5 ml und für 5 ml abgestuft.

Um 5 ml abzumessen, wird der Messlöffel so befüllt, dass der Flüssigkeitsspiegel an der Oberkante steht. Die Markierung von 2,5 ml befindet sich an der Löffelinnenseite.

Geben Sie Ihrem Kind die Dosis, die der Arzt Ihres Kindes empfohlen hat.

Kontrollieren Sie den Löffel vor dem Gebrauch auf Sauberkeit. Spülen Sie ihn gegebenenfalls mit sauberem Wasser ab.

1. Vor jeder Verabreichung die Flasche gut schütteln.
2. Den Verschluss von der Flasche abnehmen.
3. Entnehmen Sie die benötigte Dosis nach Anweisung des Arztes
4. Den Verschluss auf die Flasche aufschrauben.
5. Den Löffel sorgfältig mit sauberem Wasser ausspülen und bis zum nächsten Gebrauch vollständig trocknen lassen.

Im Kühlschrank aufbewahren und vor jedem Gebrauch schütteln.

Nach der Zubereitung sollte die Suspension innerhalb von 7 Tagen verbraucht werden.